

RESENHA DA CAPA

CARDEAL (*Paroaria coronata*)

O *Paroaria coronata* (Miller, 1776), conhecido popularmente como Cardeal, Cardeal-do-sul, Cardeal-de-topete-vermelho, Galo-de-campina, Guiratirica, Tié-guaçu-paroara, Cardenal Copete Rojo (Argentina) e Red-crested Cardinal (EUA) (WIKIAVES, 2024). É uma ave que habita áreas secas de planícies semiabertas, com árvores e arbustos dispersos. Sua ocorrência concentra-se em regiões da Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil (Figura 1). No Brasil é encontrado nos Estados das regiões Sul e Sudeste. No início do século XX foi introduzido em países como Porto Rico, Estados Unidos da América e Chile (IUCN, 2018; WIKIAVES, 2024).




Figura 1 - Identificação geográfica do habitat do *Paroaria coronata* na América do Sul.

Os Cardeais pertencem a ordem *Passeriformes*, família *Thraupidae*, subfamília *Thraupinae*, gênero *Paroaria*. Embora a espécie seja muito visada por traficantes devido a sua beleza e canto, ainda é considerada relativamente abundante. Atualmente a espécie é classificada como não ameaçada (*Least concern*) quanto ao seu estado de conservação, segundo dados da *International Union for Conservation of Nature* (IUCN, 2018).

Apresentam características morfológicas marcantes, são aves pequenas, medindo em média 18 cm, com vívido e destoante topete vermelho que remete visualmente ao barrete vermelho dos cardeais católicos, semelhança que originou o nome popular da espécie. O canto é melodioso e distinto. Sem dimorfismo sexual, sua plumagem apresenta coloração vermelho vívida na cabeça, topete, garganta e bafeiro, contrastante ao branco, presente em seu abdômen e colar por trás da cabeça, e o cinza, de sua região dorsal. As aves jovens diferem-se por sua coloração parda e topete ferrugíneo ou laranja amarronzado (TIMM; TIMM, 2016; PORT; FISCH, 2022).

São observados principalmente em áreas secas de planícies semi-abertas, forrageando o solo e em sub-bosques, alimentando-se de grãos e pequenos insetos. Comumente avistados em bandos, se dispersam na primavera e verão durante o período reprodutivo. Os machos exibem comportamento extremamente territorialista e defendem ativamente seus espaços, muitas vezes de forma agressiva em relação a outros machos que invadem seus territórios. A fêmea põe dois a três ovos por ninhada e a incubação dura aproximadamente 13 dias, geralmente tem 2 a 4 ninhadas por temporada (PORT; FISCH, 2022; SEGURA et al., 2020; WIKIAVES, 2024).

REFERÊNCIAS

IUCN - INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE. **The IUCN Red List of Threatened Species**. Red-crested Cardinal - *Paroaria coronata*, 2018. Disponível em: <<https://www.iucnredlist.org/species/22721582/132144578#assessment-information>>. Acesso em: 05 de Janeiro de 2024.

PORT, D.; FISCH, F. Distribuição e ocorrência de *Paroaria coronata* (Miller, 1776) (*Passeriformes: Thraupidae*) em Santa Catarina/Brasil. **Revista Biociências**, v. 28, n. 1, p. 14-20, 2022.

SEGURA, L. N.; DOSIL-HIRIART, F. D.; GONZÁLEZ-GARCÍA, L. N. Exotic trees fail as a support for Red-crested Cardinal (*Paroaria coronata*) nests in a native forest of East-Central Argentina. **Hornero**, v. 35, n. 1, p. 29-35, 2020.

TIMM, C. D.; TIMM, V. F. **Aves do Extremo Sul do Brasil: Guia de Identificação**. USEB, 2016. 331p.

WIKIAVES. **Cardeal**. Disponível em: <<https://www.wikiaves.com.br/wiki/cardeal>>. Acesso em: 05 de janeiro de 2024.

TEXTO: Gabriel da Silva Zani
Médico Veterinário

FOTO DA CAPA: André Luis da Silva Zani
Biólogo